

ESPÈCES DE POISSONS PRÉSENTES DANS LA RIVIÈRE YAMASKA




ESPÈCES		HABITAT	ALIMENTATION	LIMITE DE PRISE
ACHIGAN À PETITE BOUCHE		Eau fraîche (20 à 22 °C), peu profonde et claire à fond rocailleux ou sablonneux, avec abris (grosses pierres et billots submergés). Lors des chaleurs de l'été, on le retrouve en eau profonde.	La diète des adultes est composée principalement d'écrevisses, aussi de poissons (perchaude, crapets et cyprins) et d'insectes, parfois de grenouilles, têtards, oeufs de poissons et matériel végétal. Les jeunes se nourrissent surtout de plancton, puis d'insectes. L'achigan à petite bouche s'alimente à la surface, entre deux eaux ou près du fond.	6
CARPE		Eau peu profonde, chaude et stagnante ou avec un courant faible.	La carpe est omnivore. Elle se nourrit principalement de débris végétaux, mollusques, larves d'insectes, vers, crustacés, écrevisses. À l'occasion elle s'attaque aux autres poissons ou mange leurs œufs.	AUCUNE LIMITE
CRAPET DE ROCHE ET CRAPET-SOLEIL		Eau chaude (18 à 24 °C), peu profonde et claire à végétation dense et à fond rocheux, rarement à fond sédimentaire.	Le crapet se nourrit principalement sur le fond et parfois en surface. Son régime alimentaire se compose surtout d'insectes aquatiques, écrevisses et petits poissons (ménés, perchaude, parfois jeunes crapets de roche).	AUCUNE LIMITE
DORÉ JAUNE		Eau fraîche (13 à 21 °C), peu profonde (moins de 15 m) et turbide.	Le doré jaune se nourrit principalement de poissons. Il est peut sélectif et s'alimente selon la disponibilité des proies. Cependant, la perchaude et le malachigan sont très importants dans sa diète, lorsque présents. Le cannibalisme est aussi possible. Il mange également insectes, sangsues, écrevisses, limaces, petites couleuvres et salamandres, grenouilles et petits mammifères.	6
GRAND BROCHET		Eau peu profonde, chaude et à végétation dense. Eau plus profonde et plus fraîche lors des chaleurs estivales.	Le grand brochet est un carnivore opportuniste qui se nourrit de tout ce qui est le plus facile à capturer. Sa diète est principalement composée de poissons (perchaudes, meuniers, crapets, cyprins, etc.), mais il peut également manger insectes, écrevisses, grenouilles, souris, rats musqués et canetons. La taille de ses proies peut être aussi grande que le tiers ou la moitié de sa propre taille.	6
MASKINONGÉ		Eau peu profonde, claire, chaude (20 à 26 °C) et à végétation dense. Eau plus profonde et plus fraîche lors des chaleurs estivales. Lacs, baies, rivières à courant modéré.	Le maskinongé est un prédateur solitaire, sédentaire et chasse à l'affût caché dans la végétation. Il se nourrit principalement de poissons (perchaudes, meuniers, cyprins, barbottes, crapets, etc.), ayant une préférence pour les grosses proies. L'absence de ces dernières semble affecter sa croissance et sa survie. Il mange également, écrevisses, grenouilles, souris, rats musqués et plusieurs espèces d'oiseaux aquatiques (jeunes et adultes).	1



CONSIGNES



LA POSSESSION D'UN PERMIS DE PÊCHE VALIDE EST OBLIGATOIRE, TOUT COMME LE RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION LIÉE À LA LIMITE DE PRISE ET À LA REMISE À L'EAU.



LE PORT D'UNE VESTE DE FLOTTAISON EST RECOMMANDÉ EN TOUT TEMPS.



LIEUX POUR PÊCHER

DESCENTE CADORETTE, au bout de l'avenue Cadorette

PARC JEANNE-DAIGLE, à l'intersection de la rue Girouard et de l'avenue Pratte

PARC DE LA YAMASKA, à l'intersection de la rue Yamaska et de l'avenue Ringuet

CENTRE NAUTIQUE, 3198, rue Girouard Ouest